KULZER

VIVIDA

HYDROGEN PEROXIDE SUPERIOR
HPS
TECHNOLOGY

WHITENING

6% HYDROGEN PEROXIDE SUPERIOR
OFFICE PROPHY PEN

INSTRUCTIONS FOR USE

ES Instrucciones de uso

Producto cosmético – para su aplicación después de la limpieza dental por profesionales de la odontología

Objetivo previsto

Kulzer Vivida Office Prophy Pen es un producto de un solo uso para utilizar en el consultorio, recomendado para ser aplicado por profesionales dentales justo después de una limpieza dental profesional para que el paciente se familiarice con la sensación del blanqueamiento dental.

El gel HPS al 6 % se utiliza como agente blanqueador que contiene peróxido de hidrógeno en Kulzer Vivida Office Prophy Pen. Se suministra encapsulado como HPS (Peróxido de Hidrógeno Superior) para obtener un producto suficientemente estable. El peróxido de hidrógeno HPS Superior se disuelve rápidamente en radicales de oxígeno y agua. Durante el proceso de blanqueamiento, los radicales libres resultantes atacan los compuestos de doble carbono de las moléculas orgánicas, que en la mayoría de los casos son la causa de la decoloración dental.

Indicaciones

Para corregir y blanquear el color de los dientes.

Contraindicaciones

- Mujeres embarazadas y lactantes
- Menores de 18 años
- Hipersensibilidad o alergia conocidas al aroma de menta o a cualquiera de los demás ingredientes
- Los que actualmente reciben tratamiento por una enfermedad grave

Posibles efectos secundarios

En casos individuales no puede descartarse la hipersensibilidad al producto o a sus ingredientes.

Contenido

12 × Kulzer Vivida Office Prophy Pen 1,4 ml.

Principio activo

6 % de peróxido de hidrógeno.

Composición

PEG200, agua, peróxido de hidrógeno, alcohol T-butílico, ácido etidrónico, aroma de menta, hidróxido de potasio, EDTA, estannato de sodio.

Advertencias

- Contiene peróxido de hidrógeno
- Evitar el contacto con los ojos. Aclarar inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar la exposición de dientes sensibles conocidos
- No comer, beber ni fumar mientras se lleva la cubeta
- Nocivo por ingestión

Color

Transparente

Aplicación del producto

① Tratamiento previo

- Después de haber realizado una limpieza dental profesional, el dentista debe aconsejar al paciente sobre la opción de blanquear los dientes con un gel de peróxido de hidrógeno al 6 %.
- No está permitido su uso en pacientes menores de 18 años
- Informar plenamente al paciente sobre el procedimiento del tratamiento y sus riesgos. El paciente debe conocer todas las respuestas relacionadas con sus preguntas
- Evalúe la salud bucodental del paciente y aclare si sus expectativas son realistas. Informe al paciente de que en un pequeño porcentaje de pacientes los dientes no se aclararán de forma significativa
- Compruebe el estado dental y la salud oral del paciente para evaluar si está indicado un tratamiento previo. Todas las restauraciones deben estar intactas o selladas con materiales provisionales adecuados
- Informe al paciente de que las restauraciones provisionales pueden cambiar de color durante el proceso de blanqueamiento, mientras que los materiales de composite o policarbonato, los metales y las restauraciones de cerámica no se verán afectados. Es posible que sea necesario sustituir las restauraciones existentes tras el blanqueamiento, ya que solo los dientes naturales se volverán más blancos
- Para pacientes que requieren restauraciones estéticas o adhesivas, espere al menos 2 semanas después de la última sesión de blanqueamiento para permitir que el color se estabilice
- Advierta al paciente de la posible sensibilidad dental e irritación de las encías durante el tratamiento. Las encías que entran en contacto con el gel blanqueador pueden ponerse rojas o blancas, pero recuperarán su color normal al cabo de unos días

- Para un tratamiento blanqueador completo y resultados visibles, la aplicación tendría que repetirse durante al menos 2 semanas. En el caso de que el paciente decida continuar con el tratamiento, se recomienda cambiar a Kulzer Vivida Home Kit para utilizar en casa.

② Tratamiento principal

- Gire con cuidado la parte posterior del Kulzer Vivida Office Prophy Pen en el sentido de las agujas del reloj para introducir el gel blanqueador en la zona del cepillo. Tenga cuidado de no aplicar demasiado material en el cepillo de una vez
- A continuación, aplique una fina capa de gel Kulzer Vivida Office Prophy Pen sobre los dientes. La cantidad de gel blanqueador debe aplicarse con moderación
- Tenga cuidado y asegúrese de que ninguna encía u otro tejido blando entre en contacto con el gel blanqueador
- En caso de hipersensibilidad, la duración de la aplicación debe acortarse o interrumpirse
- Después de 10 a 15 minutos retirar el gel por succión
- Puede repetir los pasos de aplicación y eliminación hasta 2 veces
- Enjuagar los dientes con agua y succionar

③ Post-tratamiento

- Puede recomendar al paciente que utilice el acondicionador dental Vivida de Kulzer después del proceso de blanqueamiento
- Aconseje al paciente que no coma, beba ni fume durante al menos 30 minutos después del tratamiento. Para lograr el mejor resultado posible, el paciente debe evitar los alimentos y bebidas colorantes como el café, el té, el vino tinto y las bayas durante al menos 24 horas después del tratamiento

Información general

Observe atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y todas las instrucciones de procesamiento de otras secciones. Este producto sólo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Cualquier uso no conforme con estas instrucciones queda a discreción y bajo la responsabilidad exclusiva del profesional de la odontología. Antes de la utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados.

Instrucciones de seguridad

Los ojos y la piel pueden irritarse. Evitar el contacto con la piel. Posible sensibilización por contacto con la piel. Si el producto entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante varios minutos. Consultar a un oftalmólogo si los síntomas persisten. Manténgase fuera del alcance de los niños

Condiciones de almacenamiento

- No utilizar después de la fecha de caducidad
- Un solo uso
- Conservar a temperaturas comprendidas entre 4 °C y 25 °C (39 °F y 77 °F)
- Proteger de la luz solar
- Almacenar en un lugar seco

Información sobre el desecho

Desechar de acuerdo con la normativa local.

Información adicional

Al hacer comentarios sobre el producto, indique siempre la designación de lote LOT y el número de artículo REF. Número de artículo y designación del lote: Ver información en la jeringa/tubo/envase.

Peróxido de hidrógeno ≤ 6 %; No utilizar en menores de 18 años. Venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a odontólogos o tendrá lugar bajo su supervisión directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor para completar el ciclo de utilización.

