SPA INSTRUCCIONES DE USO

6 % de peróxido de hidrógeno/10 % y 16 % de peróxido de carbamida

Pola Day y Pola Night son geles blanqueadores dentales de alta viscosidad y pH neutro para uso doméstico. Ambos son geles transparentes de liberación sostenida y sabor agradable con una mezcla única de calmantes y acondicionadores, y un contenido de agua lo suficientemente alto para reducir aún más la sensibilidad.

INDICACIONES DE USO:
- Blanqueamiento de dientes vitales descoloridos.
- Blanqueamiento de dientes no vitales descoloridos.

INGREDIENTES:

Pola Day: glicerina, agua, PEG-12, peróxido de hidrógeno, carbómero, hidróxido de sodio, aroma, nitrato de potasio, fluoruro de sodio, ácido ciclohexano diamino tetraacético, benzoato de sodio.

Pola Night: glicerina, agua, PEG-12, peróxido de carbamida, carbómero, hidróxido de sodio, aroma, nitrato de potasio, fluoruro de sodio, ácido ciclohexano diamino tetraacético, benzoato de sodio.

PESO NETO:
Dependiendo del kit adquirido, jeringas de 1,3 o 3 g.
Consulte el exterior de la caja.

EQUIVALENTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO:
- Pola Night 10 % de peróxido de carbamida = 3,6 % de peróxido de hidrógeno
- Pola Night 16 % de peróxido de carbamida = 5,7 % de peróxido de hidrógeno

GUIA DE TRATAMIENTO:

	6%	
Pola Day	1 o 2 x 30 minutos/día **o** 1 x 45 minutos/día	
	10%	**16%**
Pola Night	1 x 2 horas/día hasta toda la noche	1 x 90 minutos/día hasta toda la noche

1. Cepíllese los dientes.
2. Retire la tapa de la jeringa de gel blanqueador y coloque la punta de aplicación girándola firmemente en la jeringa.
3. Coloque una pequeña gota de gel en cada compartimento de la bandeja de los dientes que se van a tratar.
   Consejo: Utilice los indicadores de dosis de la jeringa como guía.
   Jeringa de 3 g: Utilice aproximadamente un sexto de la jeringa por aplicación; esta cantidad es suficiente para las bandejas blanqueadoras superior e inferior.
   Jeringa de 1,3 g: Utilice aproximadamente un tercio de la jeringa por aplicación; esta cantidad es suficiente para las bandejas blanqueadoras superior e inferior.
4. Coloque la bandeja de manera que el gel quede alrededor de los dientes.
5. Limpie el exceso de gel en la boca con un pañuelo de papel o un cepillo suave seco.
6. Al acabar el tratamiento, retire la bandeja. Enjuague la bandeja y la boca con agua tibia.
7. Cepíllese los dientes.

PARA OBTENER RESULTADOS EFECTIVOS:
- No comer, beber ni fumar durante el tratamiento.
- No fumar inmediatamente después del tratamiento; se debe esperar al menos dos horas.
- Se debe evitar o moderar el consumo de alimentos y bebidas que contengan colorantes fuertes durante al menos 48 horas después del periodo de tratamiento.
- Utilizar el gel a temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:
- Conservar en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa a temperaturas de entre 2 y 25 °C (35 - 77 °F).
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

PRECAUCIONES:
- **Para venta exclusiva a odontólogos.** Por cada ciclo de uso, el primer uso deberá ser realizado únicamente por odontólogos o bajo su supervisión directa si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. Se le proporcionará posteriormente al paciente para completar el ciclo de uso.
- No debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni por personas menores de 18 años.
- Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Se recomienda que los pacientes con antecedentes de alergias químicas se sometan a una prueba de alergia, bajo supervisión de un especialista, antes de usar estos productos.
- Suspender su uso si se produce alguna sensibilidad o reacción inusual.
  Consultar a un odontólogo.
- La ficha de datos de seguridad (SDS) está disponible en www.sdi.com.au, o también puede solicitarla a su contacto regional.
- Contiene fluoruro de sodio y peróxido de hidrógeno.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Ojo (contacto):** Evitar el contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos. Buscar atención médica si los síntomas persisten.
- **Piel (contacto):** Lavar con abundante agua y buscar atención médica si los síntomas persisten.
- **Ingestión (gran cantidad):** Beber abundante leche o agua y buscar atención médica.