Detartrine / Detartrine Z

es

PRESENTACIÓN
Bote de 45 g o 150 g.

COMPOSICIÓN
Glicerol, jabón líquido, fragancia de Detartrine (etanol 96, metil ionona, aroma natural de menta, mentol, timol), monoestearato de glicerol, almidón de trigo, silicato de circonio*, goma tragacanto, silicato, cochinilla A roja, agua purificada.
**Solo para la pasta Detartrine Z.*

FINALIDAD PREVISTA
Pasta dental abrasiva para limpieza y pulido.

INDICACIONES DE USO
- Pulido de superficies raspadas
- Pulido de materiales restauradores
- Eliminación de placa dental (biopelícula bacteriana)
- Reducción de manchas de alimentos y tabaco

PÚBLICO OBJETIVO
Población destinataria
Niños y adultos con dientes permanentes.
Usuarios previstos
Profesionales de odontología.

BENEFICIO CLÍNICO
- Prevención de caries y enfermedades periodontales (profilaxis)
- Prevención de lesiones del tejido blando mediante pulido de superficies
- Realce estético

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Funcionamiento técnico

Características	Valores	Valor medio Detartrine/ Detartrine Z
Abrasividad relativa de la dentina (RDA)	100<RDA<250	- Detartrine: 168 ± 54 - Detartrine Z: 165 ± 35
Abrasividad relativa del esmalte (REA)	4.00<REA<40.00	- Detartrine: 7 ± 2 - Detartrine Z: 7 ± 2

Especificaciones técnicas
La consistencia oscila entre 30 y 70 mm.
Funcionamiento clínico
- Eliminación de la placa dental
- Reducción de manchas extrínsecas
- Alisado de las superficies dentales y de los materiales restauradores

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a uno de los componentes
- Dientes desmineralizados

INSTRUCCIONES DE USO
Con una espátula, tomar una pequeña cantidad de pasta y colocarla en un cepillo u otro instrumento de acabado adecuado.
El enjuague bucal puede llevarse a cabo durante el procedimiento de raspado o al final de este.

PRECAUCIONES DE USO
Conservar el producto en su embalaje original.
Cerrar el bote inmediatamente después de usarlo.
Comprobar la integridad del embalaje antes de utilizar el producto; no utilizarlo si el embalaje está dañado o abierto.
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. Una vez abierto, utilizarlo dentro de los 6 meses siguientes.

EFECTOS SECUNDARIOS
Hipersensibilidad a uno de los componentes.
Se ruega comunicar cualquier incidente grave que pueda ocurrir en relación con el producto a Septodont (vigilance@septodont.com) y a la autoridad local competente en materia de productos sanitarios. Se ruega comunicar todos los demás incidentes a Septodont (vigilance@septodont.com).

ALMACENAMIENTO
Conservar entre 5 °C y 30 °C.
Mantener en posición vertical.

ELIMINACIÓN
Desechar el bote y cualquier exceso de pasta en un contenedor de residuos.